

Questão 1.

- a) (1,0) Seja S a superfície de equação $2xy - 2y^2 + z^2 + 6z = 1$. Encontre o plano tangente a S no ponto $(-4, -1, -1)$.
- b) (1,5) Considere a curva $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 4y^2 = 1, 2x + 4y = z^2 \text{ e } z < 0\}$. Determine os pontos de C nos quais a reta tangente é paralela ao plano encontrado no item (a).
- c) (1,0) Encontre uma parametrização para a intersecção da superfície S do item (a) com o plano $x = 3y$.

a) Se' superfície de nível de $F(x, y, z) = 2xy - 2y^2 + z^2 + 6z$

$$\nabla F(x, y, z) = (2y, 2x - 4y, 2z + 6)$$

$$\nabla F(-4, -1, -1) = (-2, -4, 4) \parallel (1, 2, -2)$$

Equação do plano: $(x+4) + 2(y+1) - 2(z+1) = 0$

b)
$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2x_0 & 4y_0 & 0 \\ 2 & 4 & -2z_0 \end{vmatrix} = -16y_0z_0\vec{i} + 4x_0z_0\vec{j} + (8x_0 - 16y_0)\vec{k}$$

A reta tangente a C em (x_0, y_0, z_0) é paralela a $(-16y_0z_0, 4x_0z_0, 8x_0 - 16y_0)$. Para que essa reta seja paralela ao plano de a), devemos ter

$$0 = \langle (-16y_0z_0, 4x_0z_0, 8x_0 - 16y_0), (1, 2, -2) \rangle =$$

$$= -16y_0z_0 + 8x_0z_0 - 2(8x_0 - 16y_0) = \underbrace{(z_0 - 2)}_{\neq 0} (8x_0 - 16y_0)$$

Como (x_0, y_0, z_0) está em C , temos $z_0 < 0$. Logo

$$\begin{cases} x_0 = 2y_0 \\ x_0^2 + 4y_0^2 = 8y_0^2 = 1 \\ 2x_0 + 4y_0 = 8y_0 = z_0^2 \quad (\because y_0 \geq 0) \\ z_0 < 0 \end{cases}$$

$$\therefore y_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad z_0 = -\sqrt{\frac{8}{2\sqrt{2}}} = \frac{-2}{\sqrt[4]{2}}$$

Resposta: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{-2}{\sqrt[4]{2}}\right)$

$$c) \begin{cases} 2xy - 2y^2 + z^2 + 6z = 1 \\ x = 3y \end{cases} \iff$$

A

$$\begin{cases} 6y^2 - 2y^2 + z^2 + 6z = 1 \\ x = 3y \end{cases} \iff \begin{cases} 4y^2 + (z+3)^2 = 10 \\ x = 3y \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \left(\frac{z}{\sqrt{10}}y\right)^2 + \left(\frac{z+3}{\sqrt{10}}\right)^2 = 1 \\ x = 3y \end{cases} \therefore \begin{cases} \frac{z}{\sqrt{10}}y = \cos t & x = 3y \\ \frac{z+3}{\sqrt{10}} = \sin t \end{cases}$$

Uma parametrização é

$$\Gamma(t) = \left(\frac{3\sqrt{10}\cos t}{2}, \frac{\sqrt{10}\cos t}{2}, \sqrt{10}\sin t - 3 \right), t \in [0, 2\pi]$$

Questão 2. (3,5) Determine, caso existam, os valores máximo e mínimo de

$f(x, y, z) = y^2 - xz + 6y$, sobre os seguintes conjuntos (**justifique**):

a) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 4y^2 + z^2 = 36\}$;

Considere a função $g(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + z^2 - 36$ de classe \mathcal{C}^1 . Como $\nabla f(x, y, z) = (-z, 2y + 6, -x)$ e $\nabla g(x, y, z) = (2x, 8y, 2z)$, então, usando o Multiplicadores de Lagrange com uma condição, temos $\nabla f(x, y, z) // \nabla g(x, y, z) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -z & 2y + 6 & -x \\ 2x & 8y & 2z \end{vmatrix} = (4yz + 12z + 8xy, -2x^2 + 2z^2, -8yz - 4xy - 12x) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} yz + 3z + 2xy = 0 \\ x^2 = z^2 \\ 2yz + xy + 3x = 0 \\ x^2 + 4y^2 + z^2 - 36 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{as soluções do sistema } (0, 3, 0), (0, -3, 0), (4, -1, 4) \text{ e } (-4, -1, -4)$$

são os candidatos a máximos e mínimos de f sobre S .

Como $f(0, 3, 0) = 27$, $f(0, -3, 0) = -9$ e $f(\pm 4, -1, \pm 4) = -21$, temos que o valor máximo de f sobre S é 27 e o valor mínimo é -21.

b) $R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \text{ e } y \leq 2\}$.

b₁) Para determinar os máximos e mínimos de f para $x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$ e $y = 2$, utilizaremos os Multiplicadores de Lagrange com duas condições. Considere a função $h(x, y, z) = y - 2$ de classe \mathcal{C}^1 . Temos que $\nabla F(x, y, z) = (0, 1, 0)$.

$$\{\nabla f(x, y, z), \nabla g(x, y, z), \nabla h(x, y, z)\} \text{ é l.d.} \Rightarrow \begin{vmatrix} -z & 2y + 6 & -x \\ 2x & 8y & 2z \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2z^2 - 2x^2 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 = z^2 \\ x^2 + 4y^2 + z^2 - 36 = 0 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow \text{as soluções do sistema } (\pm\sqrt{10}, 2, \pm\sqrt{10}) \text{ e } (\pm\sqrt{10}, 2, \mp\sqrt{10}) \text{ são}$$

os candidatos a máximos e mínimos de f para $x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$ e $y = 2$.

b₂) Para $y < 2$ consideraremos apenas os pontos $(0, -3, 0)$, $(4, -1, 4)$ e $(-4, -1, -4)$ do item (a).

De (b₁) e (b₂), como $f(0, -3, 0) = -9$, $f(\pm 4, -1, \pm 4) = -21$, $f(\pm\sqrt{10}, 2, \pm\sqrt{10}) = 6$ e

$f(\pm\sqrt{10}, 2, \mp\sqrt{10}) = 26$, temos que o valor máximo de f sobre R é 26 e o valor mínimo é -21.

Questão 3. Dada a função $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$:

a) (1,5) classifique os pontos críticos de f ;

b) (1,5) determine os valores máximo e mínimo de f no compacto

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy + x + y = 0, -\frac{1}{2} \leq x \leq 1\}.$$

a) f é de classe C^2 em \mathbb{R}^2 e $\nabla f(x, y) = (3x^2 - 3y, 3y^2 - 3x)$.

$\nabla f(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases} \Rightarrow y = y^4 \Rightarrow y(1 - y^3) = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ ou } y = 1$. Logo, $(0, 0)$ e $(1, 1)$ são os pontos críticos.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 6y \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = -3$$

$$H(0, 0) = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = -9 < 0 \Rightarrow \boxed{(0, 0) \text{ é ponto de sela}}$$

$$H(1, 1) = \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} = 27 > 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = 6 > 0 \Rightarrow \boxed{(1, 1) \text{ é mínimo local}}$$

b) f contínua em R compacto $\Rightarrow f$ tem máx e mín absolutos em R , pelo T. Weierstrass.

$R = B \cup \{(-1/2, 1), (1, -1/2)\}$, em que $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy + x + y = 0, -1/2 < x < 1\}$.

Seja $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1/2 < x < 1\}$. Então A é aberto, f é diferenciável em A ,

$B = \{(x, y) \in A : g(x, y) = 0\}$, onde $g(x, y) = xy + x + y$ é de classe C^1 em A e

$\nabla g(x, y) = (y+1, x+1) \neq \vec{0}$ em B (pois $\nabla g(x, y) = \vec{0} \Leftrightarrow (x, y) = (-1, -1) \notin B$).

Pelo método dos multiplicadores de Lagrange, se (x, y) é extremo local de f em B

então $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tq $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$, o que implica que $\nabla f(x, y)$ e $\nabla g(x, y)$ são l.d.

$$\text{Logo, } \begin{cases} 0 = \begin{vmatrix} x^2 - y & y^2 - x \\ y+1 & x+1 \end{vmatrix} = x^3 + x^2 - xy - y - y^3 - y^2 + xy + x = (x-y)(x^2 + xy + y^2 + x + y + 1) \\ xy + x + y = 0, -1/2 < x < 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{\text{pois}}{\Rightarrow} (x-y)(x^2 + y^2 + 1) \\ &\quad \quad \quad \underbrace{xy + x + y = 0} \quad \quad \quad \underbrace{> 0} \end{aligned}$$

$$\text{Portanto, } \begin{cases} x = y \\ xy + x + y = 0 \\ -1/2 < x < 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = -2$$

$(0, 0)$ é o único candidato a extremo de f em B .

Candidatos a extremos de f em R :

$$(0, 0), (-1/2, 1) \text{ e } (1, -1/2)$$

$$f(0, 0) = 0, \quad f(-1/2, 1) = f(1, -1/2) = \frac{19}{8}$$

\uparrow
mínimo absoluto

\uparrow
máximo absoluto

Questão 1.

- a) (1,0) Seja S a superfície de equação $2xy - 2x^2 + z^2 + 6z = 1$. Encontre o plano tangente a S no ponto $(-1, -4, -1)$.
- b) (1,5) Considere a curva $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + y^2 = 1, 4x + 2y = z^2 \text{ e } z < 0\}$. Determine os pontos de C nos quais a reta tangente é paralela ao plano encontrado no item (a).
- c) (1,0) Encontre uma parametrização para a intersecção da superfície S do item (a) com o plano $3x = y$.

a) S é superfície de nível de $F(x, y, z) = 2xy - 2x^2 + z^2 + 6z$

$$\nabla F(x, y, z) = (2y - 4x, 2x, 2z + 6)$$

$$\nabla F(-1, -4, -1) = (-4, -2, 4) \parallel (2, 1, -2)$$

$$\text{Equação do plano: } 2(x+1) + (y+4) - 2(z+1) = 0$$

$$b) \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 8x_0 & 2y_0 & 0 \\ 4 & 2 & -2z_0 \end{vmatrix} = -4y_0z_0\vec{i} + 16x_0z_0\vec{j} + (16x_0 - 8y_0)\vec{k}$$

A reta tangente a C em (x_0, y_0, z_0) é paralela a $(-4y_0z_0, 16x_0z_0, 16x_0 - 8y_0)$. Para que essa reta seja paralela ao plano de a), devemos ter

$$0 = \langle (-4y_0z_0, 16x_0z_0, 16x_0 - 8y_0), (2, 1, -2) \rangle =$$

$$= -8y_0z_0 + 16x_0z_0 - 2(16x_0 - 8y_0) = \underbrace{(z_0 - 2)}_{\neq 0} (16x_0 - 8y_0).$$

Como (x_0, y_0, z_0) está em C , temos $z_0 < 2$. Logo

$$\begin{cases} y_0 = 2x_0 \\ 4x_0^2 + y_0^2 = 8x_0^2 = 1 \\ 4x_0 + 2y_0 = 8x_0 = z_0^2 \quad (\because x_0 > 0) \\ z_0 < 0 \end{cases} \quad \therefore x_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad y_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad z_0 = -\sqrt{\frac{8}{2\sqrt{2}}} = -\frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Resposta: } \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{2}{\sqrt{2}} \right)$$

$$c) \begin{cases} 2xy - 2x^2 + z^2 + 6z = 1 \\ y = 3x \end{cases} \iff \begin{cases} 6x^2 - 2x^2 + z^2 + 6z = 1 \\ y = 3x \end{cases} \quad \text{B}$$

$$\iff \begin{cases} 4x^2 + (z+3)^2 = 10 \\ x = 3y \end{cases} \iff \begin{cases} \left(\frac{2}{\sqrt{10}}x\right)^2 + \left(\frac{z+3}{\sqrt{10}}\right)^2 = 1 \\ x = 3y \end{cases}$$

$$\therefore \frac{2}{\sqrt{10}}x = \cos t \quad \frac{z+3}{\sqrt{10}} = \sin t \quad , \quad y = 3x$$

Uma parametrização é:

$$\Gamma(t) = \left(\frac{\sqrt{10}}{2} \cos t, \frac{3}{2} \sqrt{10} \cos t, \sqrt{10} \sin t - 3 \right), t \in [0, 2\pi]$$

Questão 2. (3,5) Determine, caso existam, os valores máximo e mínimo de

$f(x, y, z) = x^2 - yz + 6x$, sobre os seguintes conjuntos (**justifique**):

a) $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + y^2 + z^2 = 36\}$;

Considere a função $g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2 - 36$ de classe \mathcal{C}^1 . Como $\nabla f(x, y, z) = (2x + 6, -z, -y)$ e $\nabla g(x, y, z) = (8x, 2y, 2z)$, então, usando o Multiplicadores de Lagrange com uma condição, temos $\nabla f(x, y, z) // \nabla g(x, y, z) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2x + 6 & -z & -y \\ 8x & 2y & 2z \end{vmatrix} = (-2z^2 + 2y^2, -8xy - 4xz - 12z, 4xy + 12y + 8xz) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y^2 = z^2 \\ 2xy + xz + 3z = 0 \\ xy + 3y + 2xz = 0 \\ 4x^2 + y^2 + z^2 - 36 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{as soluções do sistema } (3, 0, 0), (-3, 0, 0), (-1, 4, 4) \text{ e } (-1, -4, -4)$$

são os candidatos a máximos e mínimos de f sobre S .

Como $f(3, 0, 0) = 27$, $f(-3, 0, 0) = -9$ e $f(-1, \pm 4, \pm 4) = -21$, temos que o valor máximo de f sobre S é 27 e o valor mínimo é -21.

b) $R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + y^2 + z^2 = 36 \text{ e } x \leq 2\}$.

b₁) Para determinar os máximos e mínimos de f para $4x^2 + y^2 + z^2 = 36$ e $x = 2$, utilizaremos os Multiplicadores de Lagrange com duas condições. Considere a função $h(x, y, z) = x - 2$ de classe \mathcal{C}^1 . Temos que $\nabla F(x, y, z) = (1, 0, 0)$.

$$\{\nabla f(x, y, z), \nabla g(x, y, z), \nabla h(x, y, z)\} \text{ é l.d.} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2x + 6 & -z & -y \\ 8x & 2y & 2z \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 2y^2 - 2z^2 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y^2 = z^2 \\ 4x^2 + y^2 + z^2 - 36 = 0 \\ x = 2 \end{cases} \Rightarrow \text{as solu\c{c}oes do sistema } (2, \pm\sqrt{10}, \pm\sqrt{10}) \text{ e } (2, \pm\sqrt{10}, \mp\sqrt{10}) \text{ s\~{a}o}$$

os candidatos a maximos e mınimos de f para $4x^2 + y^2 + z^2 = 36$ e $x = 2$.

b₂) Para $x < 2$ consideraremos apenas os pontos $(-3, 0, 0)$, $(-1, 4, 4)$ e $(-1, -4, -4)$ do item (a).

De (b₁) e (b₂), como $f(-3, 0, 0) = -9$, $f(-1, \pm 4, \pm 4) = -21$, $f(2, \pm\sqrt{10}, \pm\sqrt{10}) = 6$ e $f(2, \pm\sqrt{10}, \mp\sqrt{10}) = 26$, temos que o valor maximo de f sobre R e 26 e o valor mınimo e -21 .

Questão 3. Dada a função $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$:

a) (1,5) classifique os pontos críticos de f ;

b) (1,5) determine os valores máximo e mínimo de f no compacto

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy - x - y = 0, -1 \leq x \leq \frac{1}{2}\}.$$

a) f é de classe C^2 em \mathbb{R}^2 e $\nabla f(x, y) = (3x^2 + 3y, 3y^2 + 3x)$

$\nabla f(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x^2 \\ x = -y^2 \end{cases} \Rightarrow y = -y^4 \Rightarrow y(1+y^3) = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ ou } y = -1$ logo, $(0, 0)$ e $(-1, -1)$ são os pontos críticos.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 6y \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 3$$

$$H(0, 0) = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -9 < 0 \Rightarrow \boxed{(0, 0) \text{ é ponto de sela}}$$

$$H(-1, -1) = \begin{vmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} = 27 > 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, -1) = -6 < 0 \Rightarrow \boxed{(-1, -1) \text{ é máximo local}}$$

b) f contínua em R compacto $\Rightarrow f$ tem máx e mín absolutos pelo T. de Weierstrass

$R = B \cup \{(-1, 1/2), (1/2, -1)\}$, em que $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy - x - y = 0 \text{ e } -1 < x < 1/2\}$

Seja $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x < 1/2\}$. Então A é aberto, f é diferenciável em A ,

$B = \{(x, y) \in A : g(x, y) = 0\}$, onde $g(x, y) = xy - x - y$ é de classe C^1 em A e

$\nabla g(x, y) = (y-1, x-1) \neq \vec{0}$ em B (pois $\nabla g(x, y) = \vec{0} \Leftrightarrow (x, y) = (1, 1) \notin B$).

Pelo método dos multiplicadores de Lagrange, se (x, y) é extremo local de f em B então $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tq $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$, o que implica que $\nabla f(x, y)$ e $\nabla g(x, y)$ são l.d.

$$\text{Logo, } 0 = \begin{vmatrix} x^2+y & y^2+x \\ y-1 & x-1 \end{vmatrix} = x^3 - x^2 + xy - y - y^3 - xy + y^2 + x = (x-y)(x^2 + xy + y^2 - x - y + 1)$$

$$xy - x - y = 0, \quad -1 < x < \frac{1}{2}$$

$$\begin{matrix} \leftarrow \\ \leftarrow \end{matrix} \quad \begin{matrix} = \\ = \end{matrix} \quad (x-y)(x^2 + \underbrace{y^2 + 1}_{> 0})$$

$$\text{Portanto } \left. \begin{cases} x = y \\ xy - x - y = 0 \\ -1 < x < 1/2 \end{cases} \right\} \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } \cancel{x = 2} \quad (0, 0) \text{ é o único candidato a extremo de } f \text{ em } B$$

Candidatos a extremo de f em R :

$$(0, 0), (-1, 1/2), (1/2, -1)$$

$$f(0, 0) = 0 \quad f(-1, 1/2) = f(1/2, -1) = -\frac{19}{8}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & & \uparrow \\ \text{máximo absoluto} & & \text{mínimo absoluto} \end{matrix}$$